

## Anti-decubitus materiaal

Formulier in te vullen door behandelend arts

Naam: _____	
Adres: _____	
Postcode/Woonplaats: _____	Telefoonnummer: _____
Relatienummer: _____	Geboortedatum: _____

AD-materiaal komt alleen voor vergoeding (in bruikleen) in aanmerking als de patiënt hierop langdurig is aangewezen vanwege een verhoogd risico voor het ontstaan van decubitus. AD-materiaal dat gebruikt wordt als matras bij bijvoorbeeld ligproblemen of rugklachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. Aanspraak op AD-materiaal bestaat als de verzekerde langer dan 6 maanden op het gebruik van deze hulpmiddelen is aangewezen. Zolang niet vaststaat dat de gebruiksduur langer is dan 6 maanden, moet de verzekerde in eerste instantie de hulpmiddelen lenen op grond van de AWBZ via een daartoe bevoegde leverancier. AD-materiaal moet de eerste 3 maanden worden geleend bij het uitleenmagazijn van de AWBZ (bijvoorbeeld thuiszorg). Is het daarna nog nodig, dan kunt u een aanvraag voor verstrekking in bruikleen indienen.

### Uitgebreide medische indicatie:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Hoeveel tijd wordt in bed doorgebracht?**       minder dan 10 uur       van 10 tot 15 uur       meer dan 15 uur

**Wordt het matras preventief of curatief ingezet?**       preventief       curatief

**Stadium decubitus:**      niet wegdrukbaar roodheid/cyanose       locatie decubitus      \_\_\_\_\_  
    blaarvorming       \_\_\_\_\_  
    oppervlakkige decubitus       \_\_\_\_\_  
    diepe decubitus       \_\_\_\_\_

**Soort matras:**      vezelmatras / drukverdelend matras / statisch luchtmatras / opleg watermatras / low air matras / wisseliggings matras

**Gebruikt patiënt een AD-matras via het uitleenmagazijn van de AWBZ:**       ja       nee

zo nee, waarom niet \_\_\_\_\_

zo ja, wanneer is de uitleenperiode verlopen \_\_\_\_\_

Onderstaande alleen invullen als u geen bestaande risicoscorelijst van bijvoorbeeld de thuiszorg verstuurt.

Risicofactoren en risicoscore:	punten	Ingevuld door:
1. Mentale toestand	_____	Naam: _____
2. Neurologie	_____	Functie: _____
3. Mobiliteit	_____	Datum: _____
4. Voedingstoestand	_____	Totaalscore: _____ punten
5. Voedsel eten / drinken	_____	
6. Incontinentie	_____	
7. Leeftijd	_____	
8. Temperatuur	_____	
9. Medicatie	_____	
10. Diabetes	_____	

## Risicoscorelijst decubitus

Aantal punten	0	1	2	3
Mentale toestand	goed	lusteloos, gedeprimeerd, gedesoriëteerd, angstig	zwaar depressief, psychotisch verward, volledig apathisch	stuporeus comateus
Neurologie	geen afwijkingen	geringe stoornissen, krachtsverminderingen	sensibiliteitsstoornissen, lichte hemiparese (x 2)	hemiparese (2 maal de score) dwarslaesie (onder Th 6 = 3 maal de score, boven Th 6 = 4 maal de score)
Mobiliteit	goed	licht beperkt, loopt met hulp, rolstoelpatiënt met goede armfunctie	voornamelijk bedlegerig, alleen uit bed bij wassen en bed verschonen, hele dag passief in de stoel	geheel bedlegerig
Voedingstoestand	goed: goed gewicht, gezonde eetlust, albumine 30 - 50 g/l	ongewenst gewichtsverlies (> 5% binnen 6 maanden; 2,5% binnen 1 maand), verminderde eetlust, albumine < 35 g/l	ongewenst gewichtsverlies (> 10% binnen 6 maanden; 5% binnen 1 maand) braken of diarree, sterk, verminderde eetlust, albumine < 30 g/l	ongewenst gewichtsverlies (> 20% binnen 6 maanden; 10% binnen 1 maand), geen eetlust, albumine < 20 g/l
Voedsel (eten en drinken)	voedselinname volgens de aanbevolen hoeveelheden, volledige sondevoeding, volledige parenterale voeding	meer dan 1 week minder gegeten dan de aanbevolen hoeveelheden, gedeeltelijke sonde of parenterale voeding en geen overige voeding	meer dan 5 dagen nauwelijks voedselinname, gedeeltelijke bijvoeding en geen overige voeding	meer dan 5 dagen geen voeding en geen suppletie, langer dan 5 dagen een glucose-/ NaCl-infuus
Incontinentie	geen	af en toe urine	urine en / of faeces bij urynecatheter, uritip	geheel incontinent
Leeftijd	jonger dan 50 jaar	ouder dan 50 jaar	ouder dan 60 jaar	ouder dan 70 jaar
Temperatuur	lager dan 37,5	hoger dan 37,5	hoger dan 38,5	hoger dan 39,0 of lager dan 35,0
Medicatie	geen	corticosteroïden, anti-coagulantia (niet calperine)	slaapmiddelen, pijnstillers, tranquilizers, orale antibiotica	parenterale antibiotica
Diabetes	geen	alleen dieet	dieet / orale middelen	dieet / insuline

Voor de berekening van het percentage gewichtsverlies geldt de volgende formule:

$$\% \text{ gewichtsverlies} = \frac{\text{normale gewicht} - \text{huidige gewicht}}{\text{normaal gewicht}} \times 100$$

